Examen final : Electromagnétisme

Exercice 1 (5pts)

Soit $A = 2xyz\vec{i} + (2x^2 - y)\vec{j} - yz^2\vec{k}$ et $\phi = x^2y + 2y^2z^3$

- Donner au point (1,0,0): $\overrightarrow{\text{grad}} \phi$, $\text{div}A$, $\overrightarrow{\text{Rot}}A$

Exercice 2 (7pts)

On considère une distribution de charges qui crée en tout point M de l'espace un potentiel

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-\frac{r}{a}}}{r}$$

- 1) Calculer le champ électrique $E(r)$ et son flux ϕ à travers une sphère de rayon r .
- 2) En déduire, par application de la forme intégrale du théorème de Gauss, la charge totale Q contenue dans cette sphère.
- 3) Quelle est sa valeur pour r très petit et r très grand ?

$$\text{NB : } \phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Exercice 3 (8 pts)

On étudie une onde électromagnétique dont le champ électrique est :

$$\vec{E} = E_x \vec{u}_x + E_y \vec{u}_y$$

$$\text{Avec } E = E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z) - \omega t)}$$

L'onde se propage dans le vide et sa longueur d'onde est $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$.

- a- Calculer la fréquence de l'onde.
- b- Dans quel domaine du spectre électromagnétique se situe cette onde ?
- c- Calculer la valeur numérique de la constante k .
- d- Etablir l'équation cartésienne d'un plan d'onde.
- e- Exprimer E_y en fonction de E_x .
- f- Calculer le champ magnétique $\vec{B}$

Think Twice!

Corrigé

Exercice 1 (5pts)

- Le gradient :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{grad}} \phi(x, y, z) &= \vec{\nabla} \phi(x, y, z) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \phi(x, y, z) \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \phi(x, y, z) \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \phi(x, y, z) \vec{k} \quad (0.5) \end{aligned}$$

$$\phi = x^2y + 2y^2z^3$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \phi(x, y, z) = 2xy \quad (0.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \phi(x, y, z) = x^2 + 4yz^3 \quad (0.5)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \phi(x, y, z) = 6y^2z^2 \quad (0.5)$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} \phi(x, y, z) = 2xy \vec{i} + (x^2 + 4yz^3) \vec{j} + 6y^2z^2 \vec{k}$$

au point (1,0,0): $\overrightarrow{\text{grad}} \phi(x, y, z) = \vec{j} \quad (0.5)$

- $\text{div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (0.5)$

$$\vec{A} = 2xyz\vec{i} + (2x^2 - y)\vec{j} - yz^2\vec{k}$$

$$A_x = 2xyz, \quad A_y = (2x^2 - y), \quad A_z = -yz^2$$

$$0.5 \quad \frac{\partial A_x}{\partial x} = 2yz, \quad \frac{\partial A_y}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial A_z}{\partial z} = -2yz \quad (0.5)$$

$$\text{div } \vec{A} = 2yz - 1 - 2yz = -1 \quad (0.5)$$

- $\overrightarrow{\text{Rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xyz & (2x^2 - y) & -yz^2 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
 & \vec{i} \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ (2x^2 - y) & -yz^2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xyz & -yz^2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ 2xyz & (2x^2 - y) \end{vmatrix} \\
 & = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-yz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(2x^2 - y) \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-yz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(2xyz) \right) \vec{j} \\
 & \quad \quad \quad (0.5) \qquad \qquad \qquad (0.5) \\
 & \quad \quad \quad (0.5) \\
 & \quad \quad \quad + \left(\frac{\partial}{\partial x}(2x^2 - y) - \frac{\partial}{\partial y}(2xyz) \right) \vec{k} \\
 & \overrightarrow{Rot} \vec{A} = (-z^2 - 0)\vec{i} - (0 - 2xy)\vec{j} + (4x - 2xz)\vec{k} \\
 & \overrightarrow{Rot} \vec{A} = (-z^2)\vec{i} - (2xy)\vec{j} + (4x - 2xz)\vec{k}
 \end{aligned}$$

au point (1,0,0): $\overrightarrow{Rot} \vec{A} = 4 \vec{k}$ (0.5)

Exercice2 (7pts)

1° Forme intégrale du théorème de Gauss

Le champ $\vec{E}$ se déduit du potentiel par

$$\vec{E} = - \overrightarrow{\text{grad}} V(r), \quad (1)$$

soit ici

$$\begin{aligned}
 E_r &= - \frac{dV}{dr} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d}{dr} \frac{e^{-\frac{r}{a}}}{r} \\
 E_r &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a+r}{ar^2} e^{-\frac{r}{a}}. \quad (1.5)
 \end{aligned}$$

La forme intégrale du théorème de Gauss

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_i}{\epsilon_0}$$

appliquée à une sphère de rayon r , donne

$$4\pi r^2 \mathbf{E}(r) = \frac{Q_i(r)}{\epsilon_0}. \quad (1)$$

D'où l'expression de la charge $Q_i(r)$ contenue à l'intérieur d'une sphère de rayon r :

$$Q_i(r) = q \left(1 + \frac{r}{a} \right) e^{-\frac{r}{a}}. \quad (1.5)$$

Pour r très petit, $r \rightarrow 0$, $e^{-\frac{r}{a}} \rightarrow 1$ et $Q_i(0) = +q$. (1)
Pour r très grand, $r \rightarrow \infty$ et $Q_i(r) \rightarrow 0$. (1)

Exercice 3(8pts)

a- La fréquence de l'onde :

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad (0.25)$$

$$f = 0.5 \times 10^{15} \text{ Hz} \quad (0.25)$$

b- Dans le domaine de rayonnement visible. (1)

c- la valeur numérique de k :

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} \quad (0.25)$$

$$k = 1.047 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (0.25)$$

d- l'équation cartésienne du plan d'onde :

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = \frac{k}{3} (2x + 2y + z) \quad (0.5)$$

e- Exprimer E_y en fonction de E_x :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 \quad (0.5)$$

$$i \frac{2}{3} k E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 \quad (0.5)$$

Après intégration, on trouve :

$$E_y = -E_x \quad (0.5)$$

f- Le champ magnétique :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (0.5)$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) = \begin{vmatrix} \vec{u}_x & \vec{u}_y & \vec{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} & -E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} & 0 \end{vmatrix} \quad (0.5)$$

$$= i \frac{k}{3} E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} \vec{u}_x + i \frac{k}{3} E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} \vec{u}_y \quad (0.5)$$

$$- i \frac{4k}{3} E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} \vec{u}_z \quad (0.5)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{\partial B_x}{\partial t} = i \frac{k}{3} E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} \quad (0.25) \\ -\frac{\partial B_y}{\partial t} = i \frac{k}{3} E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} \quad (0.25) \\ -\frac{\partial B_z}{\partial t} = -i \frac{4k}{3} E_0 e^{i(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t)} \quad (0.25) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} B_x = -\frac{k}{3\omega} E_0 e^{i\left(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t\right)} \quad (0.25) \\ B_y = -\frac{k}{3\omega} E_0 e^{i\left(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t\right)} \quad (0.25) \\ B_z = \frac{4k}{3\omega} E_0 e^{i\left(\frac{k}{3}(2x+2y+z)-\omega t\right)} \quad (0.25) \end{array} \right.$$